

温泉分析書

- 1.分析申請者 住 所 神奈川県綾瀬市吉岡東1-14-13
氏 名 株式会社 日南 代表取締役 堀江勝人
- 2.源泉名及び湧出地 源泉名 妻湯
湧出地 宮崎県西都市大字調殿字寝頃687番5
- 3.湧出地における調査及び試験成績
- (1) 調査機関及び試験者 株式会社アクア分析センター 吉行 秀人
(2) 調査及び試験年月日 令和 6 年 12 月 10 日
(3) 源泉温度 45.0℃(気温 15.0℃)
(4) 湧出量 182リットル/分(動力揚湯)
(5) 知覚的試験 無色、透明、無味、無臭
(6) pH値 8.2 (ガラス電極法)
(7) 電気伝導率 0.1473 S/m
(8) ラドン含有量 5.0 Bq/L未満(1.35×10⁻¹⁰Ci/kg未満・0.38マッヘ未満)
(液体シンチレーションカウンタにおける温泉水中ラドン濃度測定方法)

- 4.試験室における試験成績
- (1) 試験機関及び試験者 株式会社アクア分析センター 吉行 秀人 倉満 恵美
(2) 分析終了年月日 令和 6 年 12 月 26 日
(3) 知覚的試験 無色、透明、無味、無臭
(4) 密度 0.9990g/cm³(20℃)
(5) pH値 8.2 (ガラス電極法)
(6) 蒸発残留物 1.028g/kg(110℃)

5.試料1kg中の成分・分量及び組成

(イ) 陽イオン

成 分	ミリグラム (mg)	ミリバール (mval)	ミリバール (%) (mval%)
リチウムイオン (Li ⁺)	2.0	0.29	1.42
ナトリウムイオン (Na ⁺)	445.1	19.36	95.71
カリウムイオン (K ⁺)	12.7	0.32	1.58
マグネシウムイオン (Mg ²⁺)	0.9	0.07	0.37
カルシウムイオン (Ca ²⁺)	3.0	0.15	0.74
ストロンチウムイオン (Sr ²⁺)	0.8	0.02	0.09
バリウムイオン (Ba ²⁺)	0.7	0.01	0.05
第一鉄イオン (Fe ²⁺)	0.2	0.01	0.04
陽イオン計	465.4	20.23	100

(ハ) 遊離成分

非 解 離 成 分	ミリグラム (mg)	ミリモル (mmol)
メタけい酸 (H ₂ SiO ₃)	30.5	0.39
メタほう酸 (HBO ₂)	23.7	0.54
非 解 離 成 分 計	54.2	0.93

溶存物質総量(ガス性のものを除く) 1.582g/kg

(ニ) その他微量成分 (mg/kg)

成 分	検 出 濃 度
銅	0.01 未満
鉛	0.01 未満
アルミニウム	0.09

(ロ) 陰イオン

成 分	ミリグラム (mg)	ミリバール (mval)	ミリバール (%) (mval%)
ふっ化物イオン (F ⁻)	4.0	0.21	1.12
塩化物イオン (Cl ⁻)	25.6	0.72	3.86
硫酸イオン (SO ₄ ²⁻)	0.5	0.01	0.06
硝酸イオン (NO ₃ ⁻)	1.4	0.02	0.12
炭酸水素イオン (HCO ₃ ⁻)	979.4	16.05	85.76
炭酸イオン (CO ₃ ²⁻)	51.0	1.70	9.08
陰イオン計	1061.9	18.72	100

溶 存 ガ ス 成 分	ミリグラム (mg)	ミリモル (mmol)
遊離二酸化炭素 (CO ₂)	検出せず	—
遊離硫化水素 (H ₂ S)	検出せず	—
非 解 離 成 分 計	0.0	0.00

成分総量: 1.582g/kg

成 分	検 出 濃 度
総ひ素	0.001 未満
総水銀	0.0005 未満
カドミウム	0.001 未満

令和 6 年 12 月 27 日

温泉の泉質および入浴上の注意等

1、泉 質 ナトリウム-炭酸水素塩温泉(低張性・弱アルカリ性・高温泉)

2、禁忌症、適用症

【浴用の禁忌症】

浴用の一般的禁忌症 病気の活動期(特に熱のあるとき)、活動性の結核、進行した悪性腫瘍又は高度の貧血など身体衰弱の著しい場合、少し動く息苦しくなるような重い心臓又は肺の病気、むくみのあるような重い腎臓の病気、消化管出血、目に見える出血があるとき、慢性の病気の急性増悪期

泉質別禁忌症 特になし

【浴用の適応症】

療養泉の一般的適応症 筋肉若しくは関節の慢性的な痛み又はこわばり(関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛、五十肩、打撲、捻挫などの慢性期)、運動麻痺における筋肉のこわばり、冷え性、末梢循環障害、胃腸機能の低下(胃がもたれる、腸にガスがたまるなど)、軽症高血圧、耐糖能異常(糖尿病)、軽い高コレステロール血症、軽い喘息又は肺気腫、痔の痛み、自律神経不安定症、ストレスによる諸症状(睡眠障害、うつ状態など)、病後回復期、疲労回復、健康増進

泉質別適応症 きりきず、末梢循環障害、冷え性、皮膚乾燥症

3、入浴上の注意事項

ア.入浴前の注意

- (ア) 食事の直前、直後及び飲酒後の入浴は避けること。酩酊状態での入浴は特に避けること。
(イ) 過度の疲労時には身体を休めること。
(ウ) 運動後30分程度の間は身体を休めること。
(エ) 高齢者、子供及び身体の不自由な人は、1人での入浴は避けることが望ましいこと。
(オ) 浴槽に入る前に、手足から掛け湯をして温度に慣らすとともに、身体を洗い流すこと。
(カ) 入浴時、特に起床直後の入浴時などは脱水症状等にならないよう、あらかじめコップ一杯程度の水分を補給しておくこと。

イ.入浴方法

- (ア) 入浴温度 高齢者、高血圧症若しくは心臓病の人又は脳卒中を経験した人は、42℃以上の高温浴は避けること。
(イ) 入浴形態 心肺機能の低下している人は、全身浴よりも半身浴又は部分浴が望ましいこと。
(ウ) 入浴回数 入浴開始後数日間は、1日当たり、1～2回とし、慣れてきたら2～3回まで増やしてもよいこと。
(エ) 入浴時間 入浴温度により異なるが、1回当たり、初めは3～10分程度とし、慣れてきたら15～20分程度まで延長してもよいこと。

ウ.入浴中の注意

- (ア) 運動浴を除き、一般に手足を軽く動かす程度にして静かに入浴すること。
(イ) 浴槽から出る時は、立ちくらみを起こさないようにゆっくり出ること。
(ウ) めまいが生じ、又は気分が不良となった時は、近くの人に助けを求めつつ、浴槽から頭を低い位置に保ってゆっくり出て、横になって回復を待つこと。

エ.入浴後の注意

- (ア) 身体に付着した温泉成分を温水で洗い流さず、タオルで水分を拭き取り、着衣の上、保温及び30分程度の安静を心がけること(ただし、肌の弱い人は、刺激の強い泉質(例えば酸性泉や硫黄泉等)や必要に応じて塩素消毒等が行われている場合には、温泉成分等を温水で洗い流した方がよいこと)
(イ) 脱水症状等を避けるため、コップ一杯程度の水分を補給すること。

オ.湯あたり

温泉療養開始後おおむね3日～1週間前後に、気分不快、不眠若しくは消化器症状等の湯あたり症状又は皮膚炎などが現れることがある。このような状態が現れている間は、入浴を中止するか、又は回数を減らし、このような状態からの回復を待つこと。

カ.その他

浴槽水の清潔を保つため、浴槽にタオルは入れないこと。



妻湯

MIYAZAKI SAITO
TSUMAYU ONSEN